

PRIMERA CITA DE COIPU *MYOCASTOR COYPUS* A L'EMPORDÀ

Carles Barriocanal*

(*) A/e: barrioca@wanadoo.es.

RESUM

Es documenta el primer registre de coipú *Myocastor coypus* a l'Empordà, a una bassa d'acumulació d'aigua d'un camp de golf de Pals (Baix Empordà).

RESUMEN

Se documenta el primer registro de coipú *Myocastor coypus* en el Empordà, en una balsa de acumulación de agua de un campo de golf de Pals (Baix Empordà).

ABSTRACT

The First recorded sighting of a coypu *Myocastor coypus* at Empordà, in a storm water accumulation pond on a golf course at Pals (Baix Empordà), is documented.

KEYWORDS: Coipú, Empordà, escapaments, *Myocastor coypus*, Pals.

El coipú *Myocastor coypus* és un rosegador de mida gran que habita en ambients humits tropicals i subtropicals de diversos països de l'Amèrica del Sud. Com que existeix una indústria que n'aprofita la pell i les incisives, l'espècie ha estat objecte d'explotació a tot el món. Des de finals del segle XIX el coipú ha estat criat en granges del sud de França, des d'on es va escapar i es va establir a bastament al territori. Arran d'aquests escapaments, l'espècie s'ha començat a detectar a la península Ibèrica (Saint-Girons, 1973). Concretament, la seva presència és important al sector més oriental del País Basc, on darrerament ha augmentat la seva àrea de distribució fins a assolir territoris navarresos (Echegaray i Hernando, 2003). S'ha citat aïlladament a Cantàbria (capçalera del riu Asón).

A Catalunya, s'ha trobat a la Vall d'Aran bastant establert, així com a la zona del Montseny (part alta de la Tordera i la riera d'Arbúcies) a Girona (Ruiz-Olmo i Aguilar, 1995). Aquestes darreres poblacions sembla que es van eliminar per l'acció directa dels caçadors locals, tot i que encara hi ha citacions del sector de la riera d'Arbúcies. Més enllà d'aquest sector no s'ha registrat mai. El diumenge 11 de gener de 2004 es va detectar un individu dins d'una bassa d'acumulació d'aigua del camp de golf Serres de Pals, Pals, Girona (fotografia 1). La troballa d'aquest individu a l'Empordà pot fer sospitar de la seva presència com un exemplar escapat d'una granja de la zona o bé de les primeres proves de l'expansió d'animals establerts al

sud de França que poden haver travessat els Pirineus. En tot cas, s'ha d'estar atent a les noves aparicions de l'espècie, per iniciar, si cal, algun pla de gestió. Els hàbits diürns de l'espècie el poden fer fàcilment detectable per seguir l'evolució d'aquests animals.



Figura 1. Exemplar de coipú al camp de golf Serres de Pals.

Bibliografia

- ECHEGARAY, J. i HERNANDO, A. 2003. Distribución del coipú (*Myocastor coypus* Molina, 1782) en Guipúzcoa y Navarra: nuevas citas. *Galemys*, 15(1):61-64.
- RUIZ-OLMO, J. i AGUILAR, A. 1995. *Els grans mamífers de Catalunya i Andorra*. Lynx Edicions. Barcelona.
- SAINT-GIRONS, M. C. 1973. *Les mammifères de France et du Benelux*. Doin. París.